

**Edital nº 008/2022 - Processo Seletivo – Multiprofissionais
Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz – HEMOGO
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG**

GABARITO DE PROVA – FISIOTERAPIA

Questão 1- Sobre os sistemas de umidificação, considere as afirmativas a seguir.

- I- A umidificação ativa não tem contraindicações de uso.**
- II- A umidificação ativa aumenta o espaço morto instrumental**
- III- A umidificação passiva deve ser retirada para realização de aerosolterapia.**
- IV- A umidificação passiva pode aumentar a resistência.**

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II e a III.
- c) Apenas a I, a III e a IV.
- d) Apenas a II, a III e a IV.

Resposta Correta: C

Questão 2- O laringoespasma é a principal causa de obstrução de vias aéreas superiores no período pós-extubação. Pode-se apresentar desde um leve estridor inspiratório até a total obstrução de VA. O estridor está presente de 2 a 16% nas pós-extubações em uma UTI e seu desenvolvimento é potencializado por

- I- Intubação > 48 horas.**
- II- Infecção traqueal.**
- III- Assincronias ventilatórias.**
- IV- Presença de sonda nasogástrica.**

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II e a III.

- c) Apenas a I, a III e a IV.
- d) Apenas a II, a III e a IV.

Resposta Correta: D

Questão 3- Supondo que haja a programação para realizar extubação endotraqueal em uma paciente internada na UTI, com 70 anos, histórico de extubação não planejada e reintubação difícil, o fisioterapeuta optou por realizar o teste de vazamento do balonete. Com o balonete insuflado, o VCI e o VCe eram de 400 ml. Após desinsuflar o balonete, o VCI é de 400 ml, e o VCe 350 ml. Considerando as informações apresentadas, o que é possível afirmar sobre a paciente desse caso?

- a) Passou no teste de vazamento do balonete, pois este correspondeu a somente 5%.
- b) Falhou no teste de vazamento do balonete, pois este correspondeu a menos de 10% do VCI.
- c) Passou no teste de vazamento do balonete, pois este correspondeu a mais de 10% do VCI.
- d) Falhou no teste de vazamento do balonete, pois este correspondeu a 10% do VCI.

Resposta Correta: C

Questão 4- Sobre as indicações para utilização de espirometria de incentivo na prática clínica, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- A utilização atual dos espirômetros de incentivos se restringe ao âmbito pós-operatório.
 - Os espirômetros de incentivos são empregados tanto na prevenção como no tratamento de complicações pulmonares.
 - Os espirômetros podem abranger comprometimentos pulmonares primários ou secundários.
 - A aplicabilidade dos espirômetros de incentivo é relacionada prioritariamente a procedimentos cirúrgicos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- a) F – V – V – F
 - b) V – F – F – V
 - c) V – F – V – F
 - d) F – V – F – V

Resposta Correta: A

Questão 5 – Uma das maneiras de titular a PEEP nos pacientes com SDRA é pelo método de PEEP decremental adequada pela complacência. Como deve ser realizado esse procedimento?

- a) Deve-se incrementar a PEEP até 23 a 26cmH₂O, partindo de valores de PEEP de 8 a 12cmH₂O, mensurando a complacência a cada passo.
- b) Deve-se iniciar com PEEP de 23 a 26cmH₂O e reduzi-la até valores de 8 a 12cmH₂O, em passos de 2 ou 3cmH₂O, até o valor de PEEP de 8 a 12cmH₂O, mensurando a complacência a cada um dos passos.
- c) Deve-se incrementar a PEEP até 45cmH₂O, conforme manobra de recrutamento alveolar máximo e, depois, retornar a PEEP de 8 a 12cmH₂O, sempre mensurando a complacência a cada passo.
- d) Deve-se incrementar a PEEP de 5 em 5cmH₂O, até alcançar valores entre 23 e 26cmH₂O, mensurando a complacência a cada um dos passos.

Resposta Correta: B

Questão 6 – A respeito da definição de uma ação de melhoria relacionada à segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Ação ou circunstância alterada para melhorar ou compensar qualquer dano depois de um incidente.
- b) Ação sem análise, para alterar os fatos.
- c) Ação empreendida para listar erros.
- d) Ação para reduzir danos futuros.

Resposta Correta: A

Questão 7 – Considerando a classificação do desmame de acordo com o *International Consensus Conference*, assinale a alternativa correta.

- a) O desmame prolongado ocorre quando não é finalizado em 7 dias após a primeira tentativa de interrupção.
- b) O desmame simples ocorre quando o paciente obtém sucesso no desmame e na extubação em até três tentativas após o primeiro TRE.
- c) O desmame difícil ocorre em pacientes que falham no primeiro TRE e necessitam de até três testes ou até 10 dias a partir do primeiro TRE para obter um desmame bem-sucedido.
- d) O desmame prolongado ocorre em pacientes que falham em, pelo menos, três TREs ou precisam de mais de 7 dias de desmame após o primeiro TRE.

Resposta Correta: A

Questão 8- Paciente do sexo masculino, 72 anos de idade, com diagnóstico prévio à internação na UTI de ICC e de hipertensão arterial sistêmica. Foi admitido na UTI com quadro de febre por 3 dias seguidos associado à dispnéia e secreção purulenta em grande quantidade. Foi prontamente intubado e ventilado mecanicamente por 5 dias. - Após resolução do quadro infeccioso, o paciente foi despertado com bom nível de consciência (pontuação na escala de coma de Glasgow=11). Utilizou VM no modo PSV por aproximadamente 36 horas, sendo, então, avaliado pelo fisioterapeuta da UTI, apresentando estabilidade hemodinâmica sem medicamentos vasoativos, gasometria arterial com oxigenação (PaO₂=82mmHg, FiO₂=30% e PEEP=5cmH₂O) e

ventilação adequadas ($\text{PaCO}_2=40\text{mmHg}$ com $\text{pH}=7,38$). - Foi submetido ao TRE (o primeiro realizado) com sucesso e conduzido à extubação planejada, sendo mantido em ventilação espontânea com uso de oxigenoterapia por cateter nasal tipo óculos (3L/min) com SpO_2 média de 94%. -Após 12 horas da extubação, o paciente apresentou $\text{FR}=38\text{ipm}$, $\text{SpO}_2=87\%$ e sinais de utilização de musculatura acessória. A equipe da unidade decidiu instituir VNI com $\text{IPAP}=10\text{cmH}_2\text{O}$ (gerando VC de 6mL/Kg de peso predito), $\text{EPAP}=5\text{cmH}_2\text{O}$ e $\text{FiO}_2=40\%$ (mantendo SpO_2 média de 86%). De acordo com o caso clínico acima, qual afirmativa está incorreta?

- a) O tipo de VNI utilizado nesse paciente foi VNI terapêutica.
- b) A VNI escolhida está associada à desfechos, como redução da mortalidade nesse perfil de pacientes.
- c) A terapêutica não invasiva recomendada para o paciente é a VNI profilática, pois ele tem idade > 65 anos, diagnóstico prévio de ICC e permaneceu por mais de 72 horas em VM.
- d) A VNI terapêutica é aplicada nos pacientes que já desenvolveram insuficiência respiratória pós-extubação, mas não tinham critérios precisos de necessidade de reintubação.

Resposta Correta: B

Questão 9 – As atividades praticadas com o paciente sentado são utilizadas frequentemente pela fisioterapia hospitalar. São considerados efeitos da sedestação:

- a) Diminuição da frequência respiratória, do volume corrente e do volume minuto.
- b) Diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial sistêmica e aumento da resistência vascular periférica.
- c) Redução do volume diastólico final e de ejeção com redução da pressão arterial sistêmica.
- d) Aumento da ventilação alveolar, diminuição do transporte mucociliar e melhora da troca gasosa.

Resposta Correta: C

Questão 10 – Com relação à síndrome de Guillain-Barré (SGB) marque V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- () O paciente acometido pela SGB apresenta disfunção, de início agudo, dos nervos periféricos e cranianos.
- () Fraqueza simétrica rapidamente progressiva, perda de reflexos, diplegia facial, parestesia orofaríngea e respiratória, além de déficit sensorial nas mãos e nos pés são sintomas da SGB.
- () A SGB é a causa mais comum de paralisia generalizada aguda ou subaguda.
- () A SGB tem caráter sistêmico e o sistema autonômico é afetado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – F – V – V
- b) F – V – V – F
- c) V – F – F – V
- d) V – V – V – V

Resposta Correta: D

GABARITO FISIOTERAPIA	
01	C
02	D
03	C
04	A
05	B
06	A
07	A
08	B
09	C
10	D