



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: ENFERMEIRO(A) CLÍNICAS (ENFERMEIRO I)

Qual é a frequência e a profundidade das compressões torácicas em adultos?

- A) Uma frequência de 60 a 80 compressões por minuto e uma profundidade de 2,5 cm.
- B) Uma frequência de 80 a 100 compressões por minuto e uma profundidade de 4 cm.
- C) Uma frequência de 120 a 140 compressões por minuto e uma profundidade de 6,4 cm.
- D) Uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de pelo menos de 5 cm.

Resposta correta: D

Durante a realização de um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto, o enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da sonda com cerca de 20 ml de água destilada. Qual finalidade desse procedimento

- A) "Ancorar" a sonda na bexiga.
- B) Manter a pressão vesical constante.
- C) Evitar a proliferação de bactérias pelo meio extra luminal.
- D) Promover a lavagem vesical gradual;

Resposta correta: A

Considerando os valores referenciais de um hemograma de paciente adulto, assinale a alternativa que os valores de hemoglobina estão fora da normalidade, segundo atualização da sociedade brasileira de hematologia:

- A) Homens 14g/dl, mulheres 15g/dl
- B) Homens 16g/dl, mulheres 16g/dl
- C) Homens 11g/dl, mulheres 17g/dl
- D) Homens 13g/dl, mulheres 14g/dl

Resposta correta: C

Referente aos procedimentos de enfermagem relacionados a curativos, analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta:

- I- O selo d'água durante o curativo de dreno torácico, deve ser mantido no nível do tórax.
 - II- O hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas limpas com pequenas quantidades de exsudato. III- A limpeza da ferida de primeira intenção deve ser realizada de fora para dentro para evitar infecção.
- A) Apenas I é verdadeira.
 - B) Itens I e III são falsos.
 - C) Apenas III é verdadeira.
 - D) Todos os itens são verdadeiros.

Resposta correta: B

A cirurgia de redesignação, em que são criadas a genitália externa e a vagina, é mais uma etapa do processo transexualizador realizado no Ambulatório TX, criado pelo HGG para atender a demanda da transexual do Estado. São critérios para participação do programa acolhimento transexual, exceto:

- A) Permissão prévia dos seus pais ou responsáveis para realização da
- B) Ter 18 anos completos para ser admitido no programa.
- C) Completar 21 anos para realizar cirurgia de redesignação sexual.
- D) Paciente precisa ter no mínimo de 2 anos com acompanhamento psicológico no HGG.

Resposta correta: A

O choque é uma das mais graves complicações pós-operatórias. Aquele em que o paciente apresenta queda na pressão venosa, elevação na periférica e taquicardia, refere-se ao choque do tipo:

- A) Neurogênico.
- B) Séptico.
- C) Anafilático.
- D) Hipovolêmico

Resposta correta: D

Durante a execução do curativo em paciente com úlcera venosa, o técnico de enfermagem, observa a presença de tecido inviável e esfacelo que acomete toda a ferida. A conduta a ser tomada é:

- A) Aplicar bota de Unna, após avaliação e conduta médica, desde que possua treinamento específico para realizar esse
- B) Realizar a irrigação da ferida com soro fisiológico morno, de forma suave, para não danificar o tecido de granulação.
- C) Auxiliar o enfermeiro no desbridamento cirúrgico.
- D) Realizar o desbridamento mecânico, de forma exaustiva, para minimizar o risco de infecção.

Resposta correta: A

Segundo a NR - 32 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e emprego, marque a alternativa incorreta:

- A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- B) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- C) É permitido o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- D) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

Resposta correta: C

Cuidado Paliativo é uma área que atrai cada vez mais atenção. Esse fato tem várias explicações, mas uma delas é a quantidade crescente de evidências científicas apontando sua eficácia. Sendo assim, podemos dizer que os Cuidados Paliativos são indicados quando:

- A) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes com doenças graves com proximidade com a terminalidade e serve para que os pacientes morram com qualidade.
- B) Os cuidados paliativos são indicados para qualquer doença que possa causar sofrimento no momento da terminalidade do paciente com o objetivo de promover a vida.
- C) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes que apresentam doença que ameacem a vida e que possam gerar algum grau de sofrimento físico, psíquico, espiritual e

social, devem ser iniciados a partir do diagnóstico de doenças que ameacem a vida e tem com objetivo promover a qualidade de vida para pacientes.

D) Alternativas A e B estão corretas.

Resposta correta: C

São recomendações do protocolo para a Prevenção de Infecções primárias da Corrente Sanguínea Associadas a cateteres intravasculares:

A) É necessária a avaliação das indicações de cateter venoso central como necessidade de monitorização hemodinâmica, administração de soluções hipotônicas ou irritativas para veias periféricas.

B) O preenchimento do checklist de inserção de cateter venoso central é obrigatório e deve ser realizado pelo médico responsável pela punção do acesso venoso central.

C) Sempre realizar a antisepsia cirúrgica das mãos com produto alcoólico (PBA) para inserção do cateter venoso central.

D) O número de tentativas de punção influencia no risco de infecção primária de corrente sanguínea.

Resposta correta: D

O que é um evento adverso?

A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.

B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos.

C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu.

D) Incidente que não atingiu o paciente

Resposta correta: B

Segundo o protocolo de cirurgia segura do Ministério da saúde, a lista de verificação de segurança cirúrgica é dividida em três fases, quais são elas?

A) Antes da indução anestésica, depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.

B) Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala cirúrgica.

C) Antes da indução anestésica, Antes da incisão cirúrgica e depois da incisão cirúrgica.

D) Antes da indução anestésica, Depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.

Resposta correta: B

O que é cultura de segurança?

A) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde".

B) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "a redução a um mínimo aceitável, do risco de dano associado à atenção à saúde."

C) Segundo a RDC de nº36/2013, "É a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente".

D) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "Conjunto de ações voltadas para a prevenção de infecções."

Resposta correta: A

Atualmente os serviços de saúde buscam pela melhoria permanente da qualidade na assistência oferecida aos usuários e o programa de acreditação destes serviços é parte importante para alcançar bons resultados. Considerando a acreditação hospitalar é correto:

A) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de ferramentas da qualidade, promover a segurança na assistência à saúde.

B) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover qualidade e a segurança na assistência à saúde.

C) Acreditação possui caráter fiscalizatório com foco na gestão financeira da instituição.

D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: B

Referente a lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, qual item abaixo não faz parte desta lista:

A) Leishmaniose tegumentar americana, violência sexual e tentativa de suicídio.

B) Raiva humana, óbito materno e febre tifoide.

C) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, dengue e lúpus eritematoso.

() D) Doença de chagas crônica, peste e eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação.

Resposta correta: C



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: ENFERMEIRO(A) DA QUALIDADE (ENFERMEIRO II)

Avedis Donabedian surge na década de 60, sistematiza o conceito sobre qualidade, propõe conceitos e um modelo unificado para indicadores composto por três componentes.

São estes:

- A) Estrutura, Processo e Resultados
- B) Estrutura, Institucionais e Resultados.
- C) Institucionais, Processo e Resultados
- D) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

Resposta correta: A

Os never events e óbitos devem ser notificados no Notivisa com uma periodicidade regular, conforme legislação vigente. Sabendo disso, qual o período definido para esta notificação?

-) A) 24 horas
- B) 48 horas
- C) 72 horas
- D) 96 horas

Resposta correta: C

Ao realizar análise crítica de um indicador qual(is) critério(s) devo garantir:

- A) O relato deve ser a explanação escrita do gráfico do indicador;
- B) O relato deve conter as causas do dado apresentado e um plano de ação para melhoria;
- C) No caso de atingimento da meta não há necessidade de
- D) A análise crítica deve descrever o fluxo da coleta dos dados do indicador.

Resposta correta: B

Na elaboração de contratos de processos entre setores, devemos priorizar os processos críticos da instituição, sendo muito importante a descrição no documento de:

- A) Prazos para execução da ação;
- B) Responsável pela execução;
- C) Descrição detalhada do processo;
- D) Alternativas a e b estão corretas apenas;

Resposta correta: D

Com base nas definições do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, o serviço de saúde deve gerenciar protocolos clínicos com vistas a aprimorar os processos de trabalho. Quais são as etapas para gerenciamento de um protocolo clínico?

- A) Adequação, implementação e acompanhamento do protocolo;
- B) Elaboração, acompanhamento e intervenção do protocolo;
- D) Elaboração, coleta de dados e análise dos resultados do protocolo.

Resposta correta: A

Segundo a metodologia brasileira de acreditação, referente ao processo de gestão de riscos, é correto afirmar:

- A) O gerenciamento de risco pode ser baseado nas entradas e saídas dos processos, mas principalmente focando as atividades que podem afetar o seu desempenho, levando em consideração suas causas, impactos, fontes tangíveis e intangíveis, limitações e mudanças.
- B) Algumas ferramentas podem ser utilizadas na identificação dos riscos;
- C) A gestão de risco é um processo sistemático responsável por identificar, tomar ações, promover medidas de bloqueio, sistematicamente as barreiras implantadas e monitorar as ocorrências;
- D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: D

Atualmente os serviços de saúde buscam pela melhoria permanente da qualidade na assistência oferecida aos usuários e o programa de acreditação destes serviços é parte importante para alcançar bons resultados. Considerando a acreditação hospitalar é correto afirmar:

- A) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de ferramentas da qualidade, promover a segurança na assistência à saúde;

B) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover qualidade e a segurança na assistência à saúde.

C) Acreditação possui caráter fiscalizatório com foco na gestão financeira da instituição;

D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: B

O indicador: proporção de pacientes com adesão as medidas preventivas do protocolo de queda se refere a

A) Processo;

B) Estrutura;

C) Resultado;

D) Assistência de enfermagem

Resposta correta: A

O indicador: total de equipamentos com defeito na instituição se refere a:

A) Processo

B) Estrutura

C) Resultado

D) Engenharia clínica

Resposta correta: B

Ferramenta prática e intuitiva utilizada para informar e assegurar o cumprimento de um conjunto de ações para solucionar a causa do problema a fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações, quem serão os responsáveis, métodos, prazos e recursos associados:

A) 5 porquês

B) 5W2H

C) Ishikawa

D) Diagrama de pareto

Resposta correta: B

Ferramenta conhecida como tempestade de ideias, estimula a criatividade da equipe, gerar o maior número de ideias e identificar possíveis soluções para problemas que impactam diretamente nos processos

- A) Ishikwa
- B) 5W2H
- C) Brainstorming
- D) PDCA

Resposta correta: C

Desenvolvido na década de 30 pelo estatístico americano Walter A. Shewhart, como sendo um ciclo de controle de processo; busca monitorar com eficácia a gestão dos processos, por meio do diagnóstico das situações indesejáveis e da consequente busca de soluções:

- A) Ciclo PDCA
- B) 5 porquês
- C) Matriz SWOT
- D) Matriz de priorização

Resposta correta: A

O que é um evento adverso?

- A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.
- B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos.
- C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu.
- D) Incidente que não atingiu o paciente.

Resposta correta: B

Segundo o protocolo de cirurgia segura do Ministério da saúde, a lista de verificação de segurança cirúrgica é dividida em três fases, quais são elas?

- A) Antes da indução anestésica, depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.
- B) Antes da indução anestésica, Antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala cirúrgica.
- C) Antes da indução anestésica, Antes da incisão cirúrgica e depois da incisão cirúrgica.
- D) Antes da indução anestésica, Depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.

Resposta correta: B

O que é cultura de segurança?

- A) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento

com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde".

B) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "a redução a um mínimo aceitável, do risco de dano associado à atenção à saúde."

C) Segundo a RDC de nº36/2013, "É a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente".

D) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "Conjunto de ações voltadas para a prevenção de infecções."

Resposta correta: A



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: ENFERMEIRO(A) II

Considerando o disposto na Portaria de Consolidação MS n. 05 de 28 de setembro de 2017 que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, marque a opção correta:

- A) A doação autóloga se refere ao ato de doar sangue de maneira altruísta em que a pessoa se voluntaria a colaborar com a manutenção dos estoques de hemocomponentes do hemocentro por iniciativa própria, sem a influência de terceiros.
- B) A doação de reposição é caracterizada doação advinda do indivíduo queo para atender à necessidade de um paciente, feitas por pessoas motivadas pelo próprio serviço, família ou amigos dos receptores de sangue para repor o estoque de componentes sanguíneos do serviço de hemoterapia.
- C) Na doação espontânea observa-se o envolvimento de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de hemoterapia, decorrente de um ato de altruísmo, em que o receptor é o próprio doador.
- D) A doação de repetição é aquela em que o doador tem o compromisso de contribuir 1 vez por ano com o serviço de hemoterapia.

Resposta correta: B

De acordo com o estabelecido pelo Manual de Hemofilia, publicado em 2015 pelo Ministério da Saúde, assinale a opção incorreta:

- A) A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência ou anormalidade da coagulante do fator VIII (hemofilia A) ou do fator IX (hemofilia B).
- B) A prevalência estimada da hemofilia é de aproximadamente um caso em cada 5.000 a 10.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia A, e de um caso em cada

30.000 a 40.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia B. A hemofilia A é mais comum que a hemofilia B e representa cerca de 80% dos casos.

C) A apresentação clínica das hemofilias A e B é semelhante, caracterizada por sangramentos intra-articulares hemorragias musculares ou em outros tecidos ou cavidades. As hemartroses afetam mais frequentemente as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxofemoral. Os episódios hemorrágicos podem surgir espontaneamente ou após traumas e variam de acordo com a atividade residual coagulante do fator VIII ou fator IX, que determina a classificação da gravidade da hemofilia.

D) Embora exista o tratamento medicamentoso para as hemofilias com reposição do fator da coagulação deficiente (fator VIII na hemofilia A ou fator IX na hemofilia B), o principal pilar a reposição ainda é a transfusão sanguínea.

Resposta correta: D

Assinale a alternativa incorreta acerca do tratamento ambulatorial hemofilia:

A) No cadastramento inicial, devem ser fornecidos dados sócio-demográficos, diagnóstico e classificação da doença, além de dados laboratoriais, exames específicos para o detalhamento da coagulopatia em questão, testes de inibidor e exames sorológicos para as doenças potencialmente transmitidas pelo sangue e hemoderivados. Esses devem ser incluídos e atualizados periodicamente.

B) O paciente deve ser avaliado de forma completa e periódica pelo menos uma vez por ano, sendo maior a frequência na infância e dependendo das complicações. Idealmente, essas avaliações devem contar com a participação da equipe multiprofissional do CTH em que o paciente é registrado.

C) A artropatia hemofílica é a seqüela mais raras e incapacitantes em pacientes com hemofilia, acometendo principalmente as articulações dos joelhos, tornozelos, cotovelos e coxo-femorais.

D) Na infância, e principalmente na adolescência e fase adulta, deve-se reforçar e estimular a prática de esportes com orientação adequada. Como exemplos, deve-se estimular a prática de natação, ginástica, ciclismo, caminhada, musculação e fazer orientação adequada sobre medidas de prevenção e controle de traumas.

Resposta correta: C

A aplicação de fatores de coagulação profiláticos representa a principal terapia para o tratamento de hemofilias. Esse tratamento é integralmente pelo Sistema Único de Saúde e tem por objetivo oferecer maior qualidade de vida aos pacientes acometidos por essa

patologia. O Centros de Tratamento de Hemofilia- CTH devem promover o Programa de Dose Domiciliar. Acerca desse programa assinale a alternativa incorreta:

A) Para instituição do tratamento domiciliar não é necessário o estímulo ao treinamento para autoinfusão, e/ou treinamento dos familiares ou pessoas relacionadas ao paciente, pois por se tratar de medicamento de alto risco deve ser administrado somente por profissionais da saúde.

B) A eficiência do tratamento do episódio hemorrágico em pacientes com hemofilia depende da reposição imediata do fator deficiente, o que abrevia o sangramento e a extensão do dano tissular.

C) A reposição imediata, por conseguinte, depende da pronta identificação da hemorragia pelo paciente e do acesso ao concentrado de fator. Além disso, sabe-se que a terapia de reposição empregada no início do sangramento reduz a quantidade necessária de fator para o controle do quadro hemorrágico.

D) É imprescindível para todos os pacientes que fazem parte dos programas de tratamento domiciliar fornecer diários ou planilhas de infusão, onde o paciente deverá fazer as anotações referentes aos episódios hemorrágicos e administração de concentrado de fator.

Resposta correta: A

Considerando o disposto na RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, a qual dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico, marque a alternativa incorreta:

A) É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.

B) Deve ser registrado minimamente um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

C) Relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem registradas, em documentos próprios da Enfermagem, as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção de um resultado esperado - um cuidado de Enfermagem digno, sensível, competente e resolutivo.

D) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, fica facultado ao profissional a impressão dos documentos e a assinatura em meio físico.

Resposta correta: D

6) Com base na RESOLUÇÃO COFEN Nº 629/2020 a qual aprova e atualiza a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem em Hemoterapia assinale a alternativa incorreta:

A) Os Enfermeiros responsáveis técnicos pelos Serviços de Hemoterapia, obrigatoriamente, deverão ser especialistas na área.

B) Os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem somente poderão atuar nos Serviços de Hemoterapia, desde que devidamente capacitados.

C) Os Enfermeiros Coordenadores de Serviços de Hemoterapia poderão atuar como membro do Comitê Transfusional Hospitalar (CTH) da Instituição ou do Hemocentro relacionado, quando se aplicar. A constituição desse comitê será compatível e adequar-se-á às necessidades e complexidades de cada Serviço de Hemoterapia.

D) A presença do Enfermeiro é essencial a fim de contribuir com a construção de manuais, normativas, protocolos e Operacionais Padrão (POPs) do serviço, participando da elaboração e implantação e implementar os protocolos da instituição para racional do sangue, manuseio da transfusão segura e Hemovigilância.

Resposta correta: A

7) Em conformidade com a RDC ANVISA n. 222 que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde assinale a alternativa incorreta:

A) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.

B) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,

dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

C) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo D compreendem os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

D) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo E: enquadra-se neste grupo o resíduo radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia.

Resposta correta: D

A triagem clínica avalia as condições clínicas, hábitos de vida e sinais e sintomas dos candidatos a doação de sangue com o objetivo de prevenir riscos tanto para doadores como também para receptores de sangue. Acerca dessa temática marque a opção incorreta:

A) Como critério para a seleção dos doadores, no dia da doação o profissional de saúde de nível superior, qualificado, capacitado, conhecedor das regras previstas na legislação vigente e sob supervisão médica, avaliará os antecedentes e o estado atual do candidato a doador para determinar se a coleta pode ser realizada sem causar prejuízo ao doador e se a transfusão dos componentes sanguíneos preparados a partir dessa doação pode vir a causar risco para os receptores.

B) Durante o processo de seleção de candidatos são avaliadas as seguintes medidas e critérios: a frequência anual máxima de doações e intervalo mínimo entre as doações, as idades mínima e máxima para doação; a massa corpórea mínima, a aferição do pulso, a aferição da pressão arterial, os níveis de hematócrito/hemoglobina, a história médica e os antecedentes patológicos do doador, a utilização de medicamentos, as hipóteses de gestação, lactação, abortamento e menstruação; o jejum e a alimentação adequada; o consumo de bebidas alcoólicas; os episódios alérgicos; as ocupações habituais e o volume a ser coletado.

C) O intervalo mínimo entre doações deve ser de 2 (dois) meses para os homens e de 3 (três) meses para as mulheres.

D) O doador de sangue ou componentes deverá ter idade entre 16 (dezesesseis) anos completos e 69 (sessenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Para tanto, devem possuir consentimento formal, por escrito, do seu responsável legal para cada doação que

realizar. Porém, os resultados dos testes de triagem laboratorial do doador somente serão entregues ao responsável legal, sem a necessidade de procuração pois o menor de idade não pode responder por si.

Resposta correta: D

As taxonomias de enfermagem são linguagens padronizadas e nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a assistência de enfermagem. Segundo a classificação taxonômica da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association International), o diagnóstico de enfermagem

- A) por título, definição, características definidoras e fatores
- B) das intervenções de enfermagem em todos os cenários e especialidades da prática.
- C) das intervenções de cuidados diretos e indiretos.
- D) da condição de saúde de um paciente, do cuidador e da família ou da comunidade.

Resposta correta: A

Em relação às ações de Segurança do Paciente marque a alternativa correta:

- A) A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão.
- B) É permitida a administração de medicamento por ordem verbal qualquer situação, desde que se utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal.
- C) Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.
- D) O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, que representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade da prestação dos cuidados em saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos na sua segurança.

Resposta correta: C

Conforme disposto na regulamentação brasileira da Sistematização da Assistência de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) Na sistematização da assistência de enfermagem, o Processo Enfermagem é organizado nas três seguintes etapas diagnóstico, execução e avaliação.
- B) Na sistematização da assistência de enfermagem, o Processo Enfermagem é organizado nas três seguintes etapas diagnóstico, execução e avaliação.
- C) O processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas ou associações comunitárias corresponde somente à consulta de enfermagem, conforme a Resolução do COFEN nº 358/2009.
- D) A tomada de decisão para a escolha de um diagnóstico NANDA requer levantamento de dados e informações do paciente, a correlação dos grupos de sinais com a sua definição, as características definidoras e os fatores relacionados.

Resposta correta: D

Com relação à sistematização da assistência de enfermagem (SAE) assinale a alternativa incorreta:

- A) A Resolução do COFEN nº 358/2009 estabelece a mesma definição para planejamento e implementação de enfermagem, uma vez que ambos os conceitos se referem à determinação dos resultados que se espera alcançar e à realização das ações determinadas.
- B) O enfermeiro deve comunicar-se de forma eficaz com o adolescente, estabelecendo um diálogo respeitoso, que inclui medidas e orientações preventivas como elemento da consulta, a fim de esclarecer questões de saúde e situações vulneráveis e promover o empoderamento e o protagonismo do adolescente em decisões pertinentes aos cuidados com sua saúde.
- C) A consulta de enfermagem, uma atividade privativa do enfermeiro, tem como característica um forte componente educativo, voltado à orientação de cuidados relacionados à promoção da saúde.
- D) O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, incluindo serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.

Resposta correta: A

Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta:

- A) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.
- B) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.
- C) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.

D) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

Resposta correta: A

Marque a alternativa incorreta em relação ao atendimento de urgência e emergência:

A) Uma das grandes causas de dispneia, sobretudo em crianças, é a obstrução por corpo estranho. Nessa situação, a manobra de Heimlich pode ser aplicada para desobstruir a via aérea do paciente.

B) A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um bloqueio total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. Os sinais clássicos de obstruções de vias aéreas leves incluem tosse silenciosa, cianose e incapacidade de falar.

C) Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada natriagem inicial como paciente em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 40 minutos até que receba atendimento médico.

D) Em um sistema de triagem que prioriza a cena segura, é feito primeiramente o direcionamento de todas as vítimas que estejam em condições de andar, para que estas saiam da cena e, em seguida, procede-se a uma avaliação rápida, a fim de se identificar aqueles que necessitam de atendimento urgente/imediato, os que podem aguardar, os de prioridade leve e as vítimas

Resposta correta: C

Em relação ao atendimento pediátrico assinale a alternativa correta:

A) O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre 2 anos de idade e 6 anos de idade não se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.

B) a) O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrófico humano de células-T).

C) Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir a "boa pega", os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo.

D) Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até o 8º mês de vida do bebê, com prolongamento até os 2 anos de idade. Somente depois do 8º mês de vida, recomenda-se a introdução de alimentos na rotina da criança.

Resposta correta: B



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: ENFERMEIRO(A) TRANSPLANTE E DIÁLISE - (ENFERMEIRO I)

Para os profissionais de enfermagem que atuam na nefrologia é importante o conhecimento científico para reconhecer as causas e sintomas de doenças, para auxiliar no diagnóstico precoce. A Doença Renal Crônica é uma síndrome decorrente da perda:

- A) Rápida, progressiva e irreversível das funções renais com retenção de substâncias nitrogenadas.
- B) Lenta, progressiva e reversível das funções renais.
- C) Lenta, progressiva e irreversível das funções renais com retenção de substâncias hidrogenadas.
- D) Lenta, progressiva e irreversível das funções renais com retenção de substâncias nitrogenadas.

Resposta correta: D

Atualmente os serviços de saúde buscam pela melhoria permanente da qualidade na assistência oferecida aos usuários e o programa de acreditação destes serviços é parte importante para alcançar bons resultados. Considerando a acreditação hospitalar é correto afirmar:

- A) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de ferramentas da qualidade, promover a segurança na assistência à saúde.
- B) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover qualidade e a segurança na assistência à saúde.
- C) Acreditação possui caráter fiscalizatório com foco na gestão financeira da instituição.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: B

Referente a lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, qual item abaixo não faz parte desta lista:

- A) Leishmaniose tegumentar americana, violência sexual e tentativa de suicídio.
- B) Raiva humana, óbito materno e febre tifoide.
- C) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, dengue e lúpus eritematoso.
- D) Doença de chagas crônica, peste e eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação.

Resposta correta: C

A produção insuficiente de hormônio pelos rins é causa importante de anemia em pacientes renais crônicos. Esse hormônio, fundamental para proliferação e maturação de células na medula óssea, é conhecido como:

- A) Vitamina D.
- B) Paratormônio.
- C) Eritropoetina.
- D) T3 e T4.

Resposta correta: C

O que é cultura de segurança?

- A) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde".
- B) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "a redução a um mínimo aceitável, do risco de dano associado à atenção à saúde. "
- C) Segundo a RDC de nº36/2013, "É a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente".
- D) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "Conjunto de ações voltadas para a prevenção de infecções. "

Resposta correta: A

6) O que é um evento adverso?

- A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.
- B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos.
- C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu.
- D) Incidente que não atingiu o paciente.

Resposta correta: B

Segundo o protocolo de cirurgia segura do Ministério da saúde, a lista de verificação de segurança cirúrgica é dividida em três fases, quais são elas?

A) Antes da indução anestésica, depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.

(X) B) Antes da indução anestésica, Antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala cirúrgica.

() C) Antes da indução anestésica, Antes da incisão cirúrgica e depois da incisão cirúrgica.

() D) Antes da indução anestésica, Depois da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.

Resposta correta: B

A Hipotensão é uma das intercorrências recorrentes durante a sessão de hemodiálise, suas principais causas são:

() A) Pequeno ganho interdialítico, velocidade baixa de ultrafiltração, peso seco superestimado e anemia.

(X) B) Alto ganho interdialítico, velocidade alta de ultrafiltração, peso seco subestimado e anemia.

() C) Pequeno ganho interdialítico, velocidade alta de ultrafiltração, peso seco superestimado e anemia.

() D) Alto ganho interdialítico, velocidade baixa de ultrafiltração, peso seco subestimado e anemia.

Resposta correta: B

Qual afirmação descreve melhor uma PCR?

A) Quando ocorre um desconforto respiratório em adultos e a frequência cardíaca não muda.

B) Quando a frequência cardíaca é de 40 a 60/min e a respiração aumenta.

C) Quando o fluxo sanguíneo para o coração é bloqueado e a frequência cardíaca aumenta.

D) Quando se desenvolve um ritmo anormal e o coração para de bater inesperadamente.

Resposta correta: D

O transplante renal configura-se como uma das possibilidades de tratamento para a pessoa com doença renal crônica, podendo o mesmo ocorrer com doador vivo ou falecido. No caso de doadores falecidos os rins são retirados após se estabelecer o diagnóstico de morte encefálica que segue rigorosos e após a permissão dos familiares. Segundo a resolução CFM nº2.173/2017, os procedimentos para determinação de morte encefálica (ME) devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem:

- A) Coma perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e persistente.
- B) Coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica, apenas.
- C) Coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente e que atendam os pré-requisitos definidos.
- D) Coma perceptivo, presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível e apneia.

Resposta correta: C

Qual é a frequência e a profundidade das compressões torácicas em adultos?

- A) Uma frequência de 60 a 80 compressões por minuto e uma profundidade de 2,5 cm
- B) Uma frequência de 80 a 100 compressões por minuto e uma profundidade de 4 cm
- C) Uma frequência de 120 a 140 compressões por minuto e uma profundidade de 6,4 cm
- D) Uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de pelo menos de 5 cm

Resposta correta: D

Os pacientes em hemodiálise têm contato com 120 a 200 litros de solução de diálise durante cada sessão. A solução de diálise é preparada com água purificada e concentrados. Portanto, a pureza química e microbiológica da solução de diálise é importante para evitar lesão ao paciente. Assinale a alternativa que contenha os passos corretos no tratamento da água utilizada na hemodiálise:

- A) Filtro de carvão, Osmose reversa, Abrandador, filtro de
- B) Filtro de areia, abrandador, filtro de carvão e osmose reversa.
- C) Abrandador, Filtro de areia, Osmose reversa e filtro de carvão.
- D) Osmose reversa, filtro de carvão, abrandador e filtro de areia.

Resposta correta: B

Segundo a NR - 32 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, marque a alternativa incorreta:

- A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- B) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- C) É permitido o reencape e a desconexão manual de agulhas. () D) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

Resposta correta: C

Cuidado Paliativo é uma área que atrai cada vez mais atenção. Esse fato tem várias explicações, mas uma delas é a quantidade crescente de evidências científicas apontando sua eficácia. Sendo assim, podemos dizer que os Cuidados Paliativos são indicados quando:

- A) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes com doenças graves com proximidade com a terminalidade e serve para que o paciente morra com qualidade.
- B) Os cuidados paliativos são indicados para qualquer doença que possa causar sofrimento no momento da terminalidade do paciente com o objetivo de promover a vida.
- C) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes que apresentam doença que ameacem a vida e que possam gerar algum grau de sofrimento físico, psíquico, espiritual e social, devem ser iniciados a partir do diagnóstico de doenças que ameacem a vida e tem como objetivo promover a qualidade de vida para pacientes.
- D) Alternativas A e B estão corretas.

Resposta correta: C

São recomendações do protocolo para a Prevenção de Infecções primárias da Corrente Sanguínea Associadas a cateteres intravasculares:

- A) É necessária a avaliação das indicações de cateter venoso central como necessidade de monitorização hemodinâmica, administração de soluções hipotônicas ou irritativas para veias periféricas.

B) O preenchimento do checklist de inserção de cateter venoso central é obrigatório e deve ser realizado pelo médico responsável pela punção do acesso venoso central.

C) Sempre realizar a antissepsia cirúrgica das mãos com produto alcoólico (PBA) para inserção do cateter venoso central.

D) O número de tentativas de punção influencia no risco de infecção primária de corrente sanguínea.

Resposta correta: D



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: ENFERMEIRO(A) UTI (ENFERMEIRO I)

No tratamento de hipotensão severa e choque, refratários à ressuscitação volêmica, a droga de primeira escolha é a:

- A) Atropina.
- B) Efedrina.
- C) Epinefrina
- D) Noradrenalina.

Resposta correta: D

Paciente deu entrada na unidade de saúde, vítima de perfuração torácica por objeto contundente, apresentando dispneia, confusão mental, ansiedade e tontura. A gasometria arterial forneceu os seguintes valores: $\text{pH} = 7,29$ $\text{PaCO}_2 = 50 \text{ mmHg}$ $\text{HCO}_3 = 30 \text{ mEq/L}$. O quadro descrito indica a ocorrência de:

- A) Acidose mista.
- B) Acidose metabólica.
- C) Alcalose respiratória.
- D) Acidose respiratória.

Resposta correta: D

Assinale a opção que apresenta a função privativa do Enfermeiro:

- A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação serviços da assistência de Enfermagem.
- C) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- D) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.

Resposta correta: B

São recomendações do protocolo para a Prevenção de Infecções primárias da Corrente Sanguínea Associadas a cateteres intravasculares:

- A) É necessária a avaliação das indicações de cateter venoso central como necessidade de monitorização hemodinâmica, administração de soluções hipotônicas ou irritativas para veias periféricas.
- B) O preenchimento do checklist de inserção de cateter venoso central é obrigatório e deve ser realizado pelo médico responsável pela punção do acesso venoso central.
- C) Sempre realizar a antisepsia cirúrgica das mãos com produto alcoólico (PBA) para inserção do cateter venoso central.
- D) O número de tentativas de punção influencia no risco de infecção primária de corrente sanguínea

Resposta correta: D

O que é um evento adverso?

- A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.
- B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos.
- C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu.
- D) Incidente que não atingiu o paciente.

Resposta correta: B

O que é cultura de segurança?

- A) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde".
- B) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "a redução a um mínimo aceitável, do risco de dano associado à atenção à saúde."
- C) Segundo a RDC de nº36/2013, "É a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente".
- D) Segundo a RDC de nº36/2013, a Cultura de segurança é definida como "Conjunto de ações voltadas para a prevenção de infecções."

Resposta correta: A

Atualmente os serviços de saúde buscam pela melhoria permanente da qualidade na assistência oferecida aos usuários e o programa de acreditação destes serviços é parte

importante para alcançar bons resultados. Considerando a acreditação hospitalar é correto afirmar:

- A) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de ferramentas da qualidade, promover a segurança na assistência à saúde.
- B) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover qualidade e a segurança na assistência à saúde.
- C) Acreditação possui caráter fiscalizatório com foco na gestão financeira da instituição.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: A

Referente a lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, qual item abaixo não faz parte desta lista:

- A) Leishmaniose tegumentar americana, violência sexual e tentativa de suicídio.
- B) Raiva humana, óbito materno e febre tifoide.
- C) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, dengue e lúpus eritematoso.
- D) Doença de Chagas crônica, peste e eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação.

Resposta correta: C

Segundo a NR - 32 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, marque a alternativa incorreta:

- A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- B) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- C) É permitido o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- D) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

Resposta correta: C

A complexidade da terapia nutricional parenteral exige o comprometimento e

a capacitação de uma equipe multiprofissional para garantir a sua eficácia e segurança e, dessa forma atingir o sucesso terapêutico. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A nutrição parenteral é uma solução ou emulsão estéril e composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas, minerais e água destilada.

() A Nutrição parenteral pode ser manipulada ou industrializada.

() A nutrição parenteral pode ser administrada por via cateter central (veia) ou dispositivo periférico.

() A nutrição parenteral pode ser desconectada para o paciente ser encaminhado ao banho ou para realizar procedimentos e depois ser reconectada desde que a ponta do equipo seja protegida.

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A) V, V, V e V.

B) V, V, V e F.

C) V, V, F e F.

D) F, V, V e V.

Resposta correta: A

Dor é uma experiência individual e multidimensional que compreende os processos de nocicepção, transdução e percepção dolorosa. A literatura dispõe de uma série de escalas de avaliação da dor recomendadas para uso clínico. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta em relação as escalas de dor:

A) Escala de braden e CAM - ICU

B) Escala de Ramsay e escala numérica

C) Escala numérica, escala comportamental de dor (BPS)

D) Escala de Glasgow, escala numérica

Resposta correta: C

PAV é definida como pneumonia nosocomial associada a ventilação mecânica que se desenvolve em 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A higiene oral com clorexidina e o decúbito elevado a 30º - 45º graus contribuem para a prevenção da PAV. () A higiene das mãos não tem relação com a prevenção da PAV. () A radiografia de tórax (RX) não é um exame utilizado como ferramenta para diagnóstico e acompanhamento da PAV.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

A) V, V e V.

B) V, F e F.

C) V, V e F.

D) F, V e F.

Resposta correta: A

Cuidado Paliativo é uma área que atrai cada vez mais atenção. Esse fato tem vários explicações, mas uma delas é a quantidade crescente de evidências científicas apontando sua eficácia. Sendo assim, podemos dizer que os Cuidados Paliativos são indicados quando:

A) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes com doenças graves com proximidade com a terminalidade e serve para que o paciente morra com qualidade

B) Os cuidados paliativos são indicados para qualquer doença que possa causar sofrimento no momento da terminalidade do paciente com o objetivo de promover a vida.

C) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes que apresentam doença que ameacem a vida e que possam gerar algum grau de sofrimento físico, psíquico, espiritual e social, devem ser iniciados a partir do diagnóstico de doenças que ameacem a vida e tem como objetivo promover a qualidade de vida para pacientes.

() D) Alternativas A e B estão corretas.

Resposta correta: C

A posição prona é uma estratégia terapêutica indicada para hipoxemia em pacientes com SDRA e tem sido bastante utilizada em pacientes com Covid-19. Com base nos protocolos para execução dessa estratégia, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Essa posição é contraindicada em pacientes com hipertensão intracraniana e arritmias agudas graves.

() Recomenda-se a "manobra do envelope" para movimentar o paciente, pois, além de facilitar o processo, propicia mais segurança ao procedimento.

() Se o paciente, após a manobra, apresentar $PaO_2 > 10\text{mmHg}$ da basal, deve-se retornar à posição supina imediatamente. As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:

A) V - V - F

B) F - F - V

C) V - V - V

D) V - F - V

Resposta correta: A

Sobre alguns fármacos utilizados em Unidades de Terapia Intensiva, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. () A vasopressina e a noradrenalina devem ser administradas por cateter venoso central devido ao alto risco de ulceração e necrose, se administradas por acesso periférico. () O nitroprussiato e a dopamina são drogas fotossensíveis e, por isso, devem ser administradas com equipo foto-protetor. () A adenosina é um antiarrítmico cuja dose inicial deve ser infundida em bolus e rapidamente (de um a dois segundos). As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:

A) F - V - F

B) V - V - V

F - F - F

V - F - V

Resposta correta: B



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM I – CLÍNICAS

Qual é a frequência e a profundidade das compressões torácicas em adultos?

- A) Uma frequência de 60 a 80 compressões por minuto e uma profundidade de 2,5 cm
- B) Uma frequência de 80 a 100 compressões por minuto e uma profundidade de 4 cm
- C) Uma frequência de 120 a 140 compressões por minuto e uma profundidade de 6,4 cm
- D) Uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de pelo menos de 5 cm

Resposta correta: D

Paciente com dreno de tórax, ao deambular, deve ser orientado

- A) Manter o frasco abaixo do nível do tórax
- B) Manter o frasco acima do nível do tórax
- C) Manter o frasco ao nível do tórax
- D) Manter o frasco acima do tórax, desde que esteja vazio

Resposta correta: A

O Técnico em Enfermagem realizou a limpeza dos seguintes artigos hospitalares: espéculo nasal, estetoscópio, bisturi e comadre. artigos hospitalares, são classificados como não críticos:

- A) Bisturi e estetoscópio
- B) Espéculo nasal e comadre
- C) Bisturi e especulo nasal
- D) Estetoscópio e comadre

Resposta correta: D

Assinale a afirmação que não descreve a finalidade do banho no leito, para os pacientes que não podem se cuidar sozinhos:

- A) Consiste na higienização de superfície corporal, tendo início pelos membros superiores, membros inferiores, couro cabeludo e
- B) Proporcionar conforto e atividade muscular
- C) Estimula a circulação sanguínea
- D) A pele íntegra é a primeira linha de defesa contra infecção

Resposta correta: A

Com relação ao preparo de corpo pós morte, assinale a alternativa incorreta:

- A) Manter a aparência mais próximo do natural antes do enrijecimento cadavérico (rigor mortis)
- B) Posicionar em decúbito dorsal, mãos juntas acima da região epigástrica e pés juntos
- C) Identificar o corpo de acordo com padrão da instituição apenas no invólucro
- D) Cobrir com a proteção padrão da instituição (ex: lençol) para o trânsito até lugar destinado

Resposta correta: C

Sobre a realização de cuidados gerais básicos aos pacientes, é INCORRETO afirmar que:

- A) A administração de oxigênio deve ser feita com cautela, pois em altas doses podem vir a inibir o estímulo da respiração
- B) A fixação da sonda nasogástrica deve ser segura, sem compressão, para evitar irritação e lesão cutânea
- C) A higiene corporal pode ser realizada sob aspersão (chuveiro), imersão (banheira) ou ablução (com jarro/banho de leito)
- D) A melhor técnica de limpeza do leito da ferida é a irrigação com jatos de soro fisiológico a 0,9% frio

Resposta correta: C

A insulina humana é um medicamento indicado para o tratamento de diabetes melito. O técnico de enfermagem deve estar atento na administração dessa medicação, pois os frascos de insulina apresentam-se em unidades internacionais (UI). Considerando que consta na prescrição médica (PM) que se deve administrar 20 UI de insulina NPH, e na Unidade Básica de Saúde há frascos de 50 UI/ml e seringa de 100 UI/ml, qual a quantidade de insulina a ser aspirada e administrada?

- A) 4 UI
- B) 10 UI
- C) 20 UI

D) 40 UI

Resposta correta: C

Qual afirmação descreve melhor uma PCR?

- A) Quando ocorre um desconforto respiratório em adultos e a frequência cardíaca não muda.
- B) Quando a frequência cardíaca é de 40 a 60/min e a respiração aumenta
- C) Quando o fluxo sanguíneo para o coração é bloqueado e a frequência cardíaca aumenta.
- D) Quando se desenvolve um ritmo anormal e o coração para de bater inesperadamente.

Resposta correta: D

Segundo a NR - 32 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e emprego, marque a alternativa incorreta:

- A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho
- B) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte
- C) É permitido o reencape e a desconexão manual de agulhas
- D) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

Resposta correta: C

Cuidado Paliativo é uma área que atrai cada vez mais atenção. Esse fato tem várias explicações, mas uma delas é a quantidade crescente de evidências científicas apontando sua eficácia. Sendo assim, podemos dizer que os Cuidados Paliativos são indicados quando:

- A) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes com doenças graves com proximidade com a terminalidade e serve para que o paciente morra com qualidade
- B) Os cuidados paliativos são indicados para qualquer doença que possa causar sofrimento no momento da terminalidade do paciente com o objetivo de promover a vida
- C) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes que apresentam doença que ameacem a vida e que possam gerara algum grau de sofrimento físico, psíquico,

espiritual e social, devem ser iniciados a partir do diagnóstico de doenças que ameacem a vida e tem como objetivo promover a qualidade de vida para pacientes

D) Alternativas A e B estão corretas

Resposta correta: C

São recomendações do protocolo para a Prevenção de Infecções primárias da Corrente Sanguínea Associadas a cateteres intravasculares:

A) É necessária a avaliação das indicações de cateter venoso central como necessidade de monitorização hemodinâmica, administração de soluções hipotônicas ou irritativas para veias periféricas

B) O preenchimento do checklist de inserção de cateter venoso central é obrigatório e deve ser realizado pelo médico responsável pela punção do acesso venoso central

C) Sempre realizar a antisepsia cirúrgica das mãos com produto alcoólico (PBA) para inserção do cateter venoso central

D) O número de tentativas de punção influencia no risco de infecção primária de corrente sanguínea

Resposta correta: D

O que é um evento adverso?

A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.

B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos

C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu

D) Incidente que não atingiu o paciente

Resposta correta: B

A cirurgia de redesignação, em que são criadas a genitália externa e a vagina, é mais uma etapa do processo transexualizador realizado pelo Ambulatório TX, criado pelo HGG para atender a demanda da população transexual do Estado. São critérios para participação do programa de acolhimento transexual, exceto:

A) Permissão previa dos seus pais ou responsáveis para realização da cirurgia de redesignação sexual

B) Ter 18 anos completos para ser admitido no programa

C) Completar 21 anos para realizar cirurgia de redesignação

D) Paciente precisa ter no mínimo de 2 anos com acompanhamento atendimento psicológico no HGG

Resposta correta: A

O choque é uma das mais graves complicações pós-operatórias. Aquele em que o paciente apresenta queda na pressão venosa, elevação na resistência periférica e taquicardia, refere-se ao choque do tipo:

- A) cardiogênico
- B) neurogênico
- C) séptico
- D) hipovolêmico

Resposta correta: D

A quantidade de soluto, em miligramas, existente em uma ampola de 10 mL de glicose a 25 % é de:

- A) 2,5
- B) 2500
- C) 22,5
- D) 250

Resposta correta: B



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM I – UTI

Paciente de 50 anos chega CTI referindo sensação de formigamento em membros superiores, boca seca, sede excessiva e perda do olfato. Diante das queixas apresentadas, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, às terminologias científicas corretas.

- A) Parestesia, xerostomia, polidipsia e anosmia.
- B) Paresia, anosmia, xerostomia e polidipsia.
- C) Polifagia, parestesia, hiposmia e sialorreia.
- D) Plegia, xerasia, polifagia e hiposmia.

Resposta correta: D

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Assinale a alternativa incorreta:

- A) A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa.
- B) A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento.
- C) A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão e
- D) A lesão pode ser classificada em quatro estágios, sendo o primeiro estágio caracterizado por esfacelo e/ou escara visível
- D) Plegia, xerasia, polifagia e hiposmia.

Resposta correta: D

Segundo a NR - 32 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e emprego, marque a alternativa incorreta:

A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

B) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

C) É permitido o reencape e a desconexão manual de agulhas.

D) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

Resposta correta: C

O que é um evento adverso?

A) Incidente que atingiu o paciente e não causou danos.

B) Incidente que atingiu o paciente e causou danos.

C) Houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu.

D) Incidente que não atingiu o paciente.

Resposta correta: B

Sobre a administração de medicamentos na via Intravenosa, qual dos itens abaixo se refere a uma das complicações dessa via de administração e é caracterizada pelo extravasamento de líquido para fora do vaso sanguíneo, causando edema, resfriamento no local, velocidade de infusão lenta ausência de retorno venoso?

A) Hematoma.

B) Infiltração.

C) Flebite.

D) Infecção.

Resposta correta: C

Cuidado Paliativo é uma área que atrai cada vez mais atenção. Esse fato tem várias explicações, mas uma delas é a quantidade crescente de evidências científicas apontando sua eficácia. Sendo assim, podemos dizer que os Cuidados Paliativos são indicados quando:

A) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes com doenças graves com proximidade com a terminalidade e serve para que o paciente morra com qualidade.

B) Os cuidados paliativos são indicados para qualquer doença que possa causar sofrimento no momento da terminalidade do paciente com o objetivo de promover a vida.

C) Os cuidados paliativos são indicados para pacientes que apresentam doença que ameacem a vida e que possam gerara algum grau de sofrimento físico, psíquico, espiritual e social, devem ser iniciados a partir do diagnóstico de doenças que ameacem a vida e tem com objetivo promover a qualidade de vida para pacientes.

D) Alternativas A e B estão corretas.

Resposta correta: C

Atualmente os serviços de saúde buscam pela melhoria permanente da qualidade na assistência oferecida aos usuários e o programa de acreditação destes serviços é parte importante para alcançar bons resultados. Considerando a acreditação hospitalar é correto afirmar:

A) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de ferramentas da qualidade, promover a segurança na assistência à saúde.

B) Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover qualidade e a segurança na assistência à saúde.

C) Acreditação possui caráter fiscalizatório com foco na gestão financeira da instituição.

D) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta correta: B

A insulina humana é um medicamento indicado para o tratamento de diabetes melito. O técnico de enfermagem deve estar atento na administração dessa medicação, pois os frascos de insulina apresentam-se em unidades internacionais (UI). Considerando que consta na prescrição médica (PM) que se deve administrar 20 UI de insulina NPH, e na Unidade Básica de Saúde há frascos de 50 UI/ml e seringa de 100 UI/ml, qual a quantidade de insulina a ser aspirada e administrada?

A) 4 UI

B) 10 UI

C) 20 UI

D) 40 UI

Resposta correta: C

No tocante aos procedimentos de enfermagem relacionados a curativos, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I - O selo d'água, durante o curativo de um dreno torácico, deve ser mantido no mesmo nível do tórax.

II - O hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas limpas com pequenas quantidades de exsudato.

III - A limpeza da ferida cirúrgica deve ser realizada de fora para dentro para infecção.

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

Resposta correta: B

Como se sabe, os artigos não críticos devem ser desinfetados. Assinale alternativa que apresenta tais artigos:

A) Agulhas, tubos de aspiração respiratória, roupas de cama.

B) Estetoscópio, comadres, cateteres intravasculares.

C) Utensílios de alimentação, tubos endotraqueais, sondas

D) Roupas de cama, estetoscópios, comadres.

Resposta correta: D

Os antibióticos, para serem administrados por via venosa, devem diluídos. No caso de uma prescrição médica que prevê vancomicina 500 mg, a cada 08 horas, diluída em soro glicosado 5% 30 mL para infundir em 40 minutos, o quantitativo de gotas e microgotas que será gerado é

A) 22 gotas e 67 microgotas por minuto.

B) 18 gotas e 67 microgotas por minuto.

C) 36 gotas e 79 microgotas por minuto.

D) 14 gotas e 45 microgotas por minuto.

Resposta correta: D

O profissional de enfermagem, independentemente do seu nível de atuação, deve ter conhecimento teórico e prático dos procedimentos por ele executados, para que não

ocorra um comportamento que seja contrário ao Código de Ética da profissão. Segundo esse código, negligência é:

- A) Realizar um ato incompetente por falta de habilidade técnica, por desconhecimento técnico e científico da competência no exercício de sua profissão.
- B) Realizar um ato incompetente por falta de habilidade técnica, por desconhecimento técnico e do exercício da profissão.
- C) Realizar uma ação sem o cuidado necessário. É uma atuação precipitada, insensata ou impulsiva.
- D) Faltar com técnica no exercício da profissão, caracterizada ausência de conhecimento sobre a ação desenvolvida.

Resposta correta: B

Referente a lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, qual item abaixo não faz parte desta lista:

- A) Leishmaniose tegumentar americana, violência sexual e tentativa de suicídio.
- B) Raiva humana, óbito materno e febre tifoide.
- C) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, dengue e lúpus eritematoso.
- D) Doença de chagas crônica, peste e eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação.

Resposta correta: C

Qual é a frequência e a profundidade das compressões torácicas em adultos?

- A) Uma frequência de 60 a 80 compressões por minuto e uma profundidade de 2,5 cm.
- B) Uma frequência de 80 a 100 compressões por minuto e uma profundidade de 4 cm.
- C) Uma frequência de 120 a 140 compressões por minuto e uma profundidade de 6,4 cm.
- D) Uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de pelo menos de 5 cm.

Resposta correta: D

Sobre a realização de cuidados gerais básicos aos pacientes, é INCORRETO afirmar que:

- A) A administração de oxigênio deve ser feita com cautela, pois em altas doses podem vir a inibir o estímulo da respiração.
- B) A fixação da sonda nasogástrica deve ser segura, sem compressão, para evitar irritação e lesão cutânea.

C) A higiene corporal pode ser realizada sob aspersão (chuveiro), imersão (banheira) ou ablução (com jarro/banho de leito).

D) A melhor técnica de limpeza do leito da ferida é a irrigação com jatos de soro fisiológico a 0,9% frio.

Resposta correta: C



QUESTÕES DAS PROVAS ON-LINE - EDITAL 001/2022

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM II

Sobre a escolha dos locais de injeção intramuscular, é CORRETO afirmar que:

- A) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante inferior interno, cerca de 20 cm abaixo da crista ilíaca.
- B) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha fazendo um ângulo de 45° com o músculo e pode acrescentar até 3,5 ml de solução, indiferente do calibre da agulha.
- C) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante superior externo, cerca de 5 cm abaixo da crista ilíaca.
- D) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha em ângulo de 90° com o músculo.

Resposta correta: D

De acordo com a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, NÃO é atribuição do Profissional Técnico de Enfermagem:

- A) Realizar consulta de enfermagem.
- B) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- C) Orientar e supervisionar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) Participar da equipe de saúde.

Resposta correta: A

Técnica recomendada para o cateterismo vesical urinário intermitente em domicílio para paciente independente para o autocuidado é a:

- A) Séptica.
- B) Asséptica.
- C) Cirúrgica.
- D) Limpa.

Resposta correta: D

A classificação abaixo apresenta tipos de processamento de materiais e a da direita, a definição de cada um. Numere as opções a seguir e escolha a sequência correta:

1- Descontaminação

2- Limpeza

3- Desinfecção

4- Esterilização

() É o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, exceto os esporulados.

() É o processo manual mecânico de remoção de sujidade, reduzindo a população microbiana.

() É o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive os esporulados.

() Processo de redução dos microrganismos de artigos e superfícies, tornando-os seguros para o manuseio.

A) 3, 2, 4, 1

B) 4, 1, 3, 2

C) 1, 3, 2, 4

D) 2, 4, 1, 3

Resposta correta: A

Considerando o disposto na RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, a qual dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico, marque a alternativa incorreta:

A) É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.

B) Deve ser registrado minimamente um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os

resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

C) Relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem registradas, em documentos próprios da Enfermagem, as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção de um resultado esperado - um cuidado de Enfermagem digno, sensível, competente e resolutivo.

D) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, fica facultado ao profissional a impressão dos documentos e a assinatura em meio físico.

Resposta correta: D

Sobre a definição de pandemia, assinale a afirmativa correta.

A) É a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.

B) É determinada quando os casos se restringem a uma área geográfica geralmente pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada.

C) É definida quando a doença se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta.

D) É uma doença com duração contínua que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.

Resposta correta: C

Em conformidade com a RDC ANVISA n. 222 que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde assinale a alternativa incorreta:

A) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.

B) Entendem-se como resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

C) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo D compreendem os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

D) Os resíduos de serviços de saúde do Grupo E: enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia.

Resposta correta: D

Em relação à Sala de Vacinação é CORRETO afirmar:

A) A sala de vacinação é classificada como uma área semicrítica e por isso deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos.

B) A sala de vacinação é classificada como uma área crítica e, por isso, para entrar nela todos deve estar com o calendário de vacinas em dia.

C) A sala de vacinação não é classificada de acordo com áreas de risco de contaminação por ser uma sala simples.

D) A sala de vacinação pode acondicionar imunobiológicos e procedimentos, pois não há riscos potenciais de

Resposta correta: A

Em relação às Políticas de Saúde no Brasil, analise as afirmativas.

I- A 8ª Conferência Nacional de Saúde teve como composição três eixos temáticos: 1) saúde como direito; 2) reformulação do Sistema Nacional de Saúde e 3) financiamento do setor.

II- A Lei n.º 8.080/1990 instituiu o SUS, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo público.

III- A iniciativa privada não pode participar do SUS, nem mesmo em caráter complementar.

IV- A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área saúde, entre outras providências.

Está correto o que se afirmar que:

A) I e III, apenas.

B) I, II e IV, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) III e IV, apenas.

Resposta correta: B

Em relação às ações de Segurança do Paciente marque a alternativa correta:

- A) A equipe de enfermagem deve implementar a prática de verificação dos sete certos na administração de medicamentos, a fim de confirmar os seguintes aspectos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa e razão.
- B) É permitida a administração de medicamento por ordem verbal qualquer situação, desde que se utilize o método de dupla checagem para a administração, com registro por escrito da ordem verbal.
- C) Para garantir que um medicamento seja administrado pela via certa, deve-se confirmar se a via de administração prescrita é a tecnicamente recomendada para a administração do fármaco indicado na prescrição médica.
- D) O PNSP surgiu para atender a necessidade de operacionalização da definição da segurança do paciente, que representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade da prestação dos cuidados em saúde. Embora bastante avançado, esse programa apresenta lacunas, como a não inclusão dos cidadãos na sua segurança.

Resposta correta: C

Sobre os cuidados importantes em relação à administração de insulina, é CORRETO afirmar:

- A) Deve-se fazer a agitação vigorosa antes da aplicação da insulina, uma vez que isso produz bolhas, o que colabora com a precisão da dose.
- B) A insulina lacrada deve ser armazenada em geladeira na qual seja improvável ocorrer o congelamento. Recomenda-se retirá-la da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação e/ou rolá-la entre as palmas das mãos até atingir a temperatura ambiente.
- C) A insulina não é uma droga termosensível, podendo expô-la a luz ou à agitação excessiva.
- D) Caso a temperatura ambiente seja superior a 30°C, a insulina não precisa ser armazenada em geladeira.

Resposta correta: B

Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura.

B) Foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 529/2013 com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

C) Define como evento adverso o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.

D) A RDC/Anvisa n.º 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e regulamenta aspectos da segurança do paciente, como a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, a obrigatoriedade da notificação dos eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente.

Resposta correta: C

Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta:

A) Se as mãos tocarem a pia, durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.

B) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.

C) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.

D) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

Resposta correta: A

São manifestações de disfunção respiratória com hipoxemia:

A) Intolerância ao decúbito e chiados.

B) Taquipneia e assimetria torácicas.

C) Sibilos e estridor inspiratório.

D) Uso de musculatura acessória e confusão mental.

Resposta correta: D

Em relação ao atendimento pediátrico assinale a alternativa :

A) O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária entre 2 anos de idade e 6 anos de idade não se correlaciona com diarreia crônica e baixo crescimento.

B) O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de

C) Na amamentação, a mãe deve receber da equipe de enfermagem a orientação de que, para garantir a "boa pega", os lábios do bebê não devem encobrir a aréola que circunda o mamilo.

D) Orienta-se a importância do aleitamento materno exclusivo até o 8º mês de vida do bebê, com prolongamento até os 2 anos de idade. Somente depois do 8º mês de vida, recomenda-se a introdução de alimentos na rotina da criança.

Resposta correta: B