

**Edital nº 008/2022 - Processo Seletivo – Multiprofissionais
Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz – HEMOGO
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG**

GABARITO DE PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM I – HEMODIÁLISE

Questão 1 - Um técnico de enfermagem deve exercer sua função com base na ética profissional. Assim, de acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, é uma responsabilidade/dever do técnico de enfermagem:

- a) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
- b) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, na qual não conste a assinatura e o número de registro do profissional.
- c) Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.
- d) Posicionar-se contra falta cometida, durante o exercício profissional, seja por perícia, imprudência ou negligência.

Resposta Correta: D

Questão 2 - O processo de hemodiálise é muito desgastante para o paciente, pois durante uma sessão de hemodiálise pode haver intercorrências. As mais comuns são:

- a) Hemólise, embolia gasosa, hipotensão e síndrome do primeiro uso.
- b) Síndrome do primeiro uso, câimbras, cefaléia e Hipertensão.
- c) Síndrome do desequilíbrio, Hipotensão, Arritmias e câimbras.
- d) Hipotensão, câimbras, Vômitos e Cefaléia.

Resposta Correta: D

Questão 3 - “Reuso” em diálise significa a utilização do dialisador e linhas arteriais e venosas, por mais de uma vez para o mesmo paciente, após os reprocessamentos adequados. É permitido pela RDC 154 de 2004 serem reprocessados, no máximo:

- a) 12 (doze) vezes, quando utilizado o reprocessamento manual, ou 20 (vinte) vezes, quando utilizado reprocessamento automático em máquinas registradas na ANVISA.
- b) 20 (vinte) vezes, quando utilizado o reprocessamento manual, ou 12 (doze) vezes, quando utilizado reprocessamento automático em máquinas registradas na ANVISA.
- c) 10 (dez) vezes, quando utilizado o reprocessamento manual, ou 12 (doze) vezes, quando utilizado reprocessamento automático em máquinas registradas na ANVISA.
- d) 12 (doze) vezes, quando utilizado o reprocessamento manual, ou 10 (dez) vezes, quando utilizado reprocessamento automático em máquinas registradas na ANVISA.

Resposta Correta: A

Questão 4 - Para o paciente que realiza hemodiálise, o melhor acesso para a realização do método em relação às infecções e a melhor eficiência da diálise é:

- a) Cateter Venoso Central Definitivo, pois seu fluxo é constante e a taxa de infecção é menor que das fístulas.
- b) Cateter Venoso Central Temporário, pois seu fluxo é constante e a troca periódica evita infecções.
- c) Fístula Arterial Venosa, pois seu fluxo é constante e a taxa de infecção é menor que dos cateteres.
- d) Cateter Venoso Central Temporário ou fístula, pois os dois têm fluxo constante e taxas de infecções semelhantes.

Resposta Correta: C

Questão 5 - Em relação às práticas seguras na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das regras de segurança é administrar os medicamentos que constem na prescrição “fazer se necessário”, “conforme ordem médica”, mesmo que a posologia esteja omitida.
- b) A observação dos cinco certos na administração de medicamentos garante que os erros de administração não ocorrerão.
- c) A antecipação ou o atraso da administração do medicamento em relação ao horário predefinido pode ser alterado de acordo com a necessidade de quem administra os medicamentos.
- d) Deve-se implantar a dupla checagem das doses prescritas principalmente para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância.

Resposta Correta: D

Questão 6 - Um técnico de enfermagem adota precauções padrão para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Assim, é correto afirmar que esse técnico:

- a) Usa luvas sempre que toca no paciente, independente do risco de contato com fluidos corporais.
- b) Faz uso de máscara cirúrgica quando entra no quarto do paciente.
- c) Higieniza as mãos antes e após o contato com qualquer paciente.
- d) Utiliza avental quando está em contato com superfícies próximas ao leito do paciente.

Resposta Correta: C

Questão 7 - A hipertensão arterial sistêmica se apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, ao que reforça a relevância do diagnóstico precoce. Os procedimentos de medida da pressão são simples e de fácil realização, contudo nem sempre são realizados de forma adequada. Sabendo da importância de executar corretamente essa técnica, assinale a alternativa correta:

- a) O paciente deve estar deitado com o braço apoiado e na altura do precórdio.
- b) A câmara inflável deve cobrir até um terço da circunferência do braço.
- c) Deve-se palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- d) A pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos (fase V).

Resposta Correta: C

Questão 8 - É o principal anticoagulante utilizado nas unidades de hemodiálise para a garantia da não coagulação do circuito extracorpóreo e continuidade da sessão de hemodiálise. Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna.

- a) Warfarina
- b) Enoxaparina
- c) Heparina
- d) Aspirina

Resposta Correta: C

Questão 9 - Fístula arteriovenosa (FAV) é confeccionada cirurgicamente, unindo uma artéria a uma veia, e fornece acesso prolongado para a hemodiálise.

Considerando os cuidados e orientações para pacientes com FAV, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É contraindicado realizar punção venosa no braço da FAV.
- b) O paciente deve ser orientado para não dormir com a cabeça onde se localiza a FAV.
- c) Lavar o sítio da fístula antes de iniciar a hemodiálise.
- d) Aferir pressão arterial no membro da FAV.

Resposta Correta: D

Questão 10 - "O acesso venoso central é obtido pela inserção de um cateter intravascular em veias profundas (subclávia, jugular, femoral) pelo médico, responsável legal, com finalidade terapêutica." Marque a alternativa INCORRETA em relação aos cuidados recomendados aos pacientes para reduzir o risco de infecção.

- a) Manter o cateter protegido com o curativo.
- b) Molhar o cateter ao tomar banho e trocar o curativo em casa.
- c) Ter cuidado nas manipulações do cateter para não danificá-lo, principalmente ao vestir-se.
- d) Em caso de saída do cateter, comprimir o local e procurar imediatamente um serviço de saúde.

Resposta Correta: B