



**Edital nº 002/2023 - Processo Seletivo – Multiprofissionais  
Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz – HEMOGO  
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG**

**GABARITO DE PROVA – PSICÓLOGO HOSPITALAR - IDENTIDADE DE GÊNERO**

- Quadro psicopatológico no qual um sujeito apresenta um excessivo amor próprio, acredita que é especial e superior aos outros, o que prejudica suas relações interpessoais. Nesse quadro, o sujeito também tende a apresentar um comportamento controlador e opressivo sobre as pessoas ao seu redor. É uma condição na qual a pessoa tem uma noção excessiva de autoimportância, uma preocupação extrema consigo mesma e falta de empatia com os outros, apresentando comportamentos abusivos e manipulativos. O quadro descrito refere-se ao/à:

- (A) Transtorno de Personalidade Esquizotípica.
- (B) Transtorno de Personalidade Boderline
- (C) Transtorno de Personalidade Narcisista.
- (D) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.

**Resposta Correta: C**

- Os pacientes com transtorno de personalidade borderline:

- (A) Têm como manifestações comuns a ausência de identidade consistente do self, e déficits nas relações interpessoais.
- (B) Apresentam um embotamento afetivo e uma estabilidade em seus comportamentos e atitudes durante todo o curso da doença.
- (C) Concentram toda a sua energia em evitar os relacionamentos íntimos e exclusivos, como forma de se proteger do abandono.
- (D) Estão imunes às distorções da realidade, em função de sua necessidade de controlar o ambiente externo.

**Resposta Correta: A**



- Análise a seguinte afirmação: “Toda identidade é construída através dos efeitos de uma relação de saber-poder-prazer pelas quais determinadas possibilidades de fixação identitária reprimem, excluem, negam, interdita outras possibilidades de posição de sujeito”(Peres 2013). Tal afirmação, apoiada na teoria Queer, permite concluir que a despatologização de um homossexual ou transexual decorre, necessariamente, de uma concepção da identidade sexual, que, desvinculando-a dos discursos normativos, a reconheça, necessariamente, como uma organização subjetiva caracterizada por sua:

- (A) Universalidade e historicidade.
- (B) Historicidade e flexibilidade.
- (C) Mutabilidade e binaridade.
- (D) Binaridade e flexibilidade.

**Resposta Correta: C**

- O transtorno de personalidade que corresponde a um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada, é identificado por transtorno da personalidade:

- (A) disruptiva.
- (B) histriônica.
- (C) *borderline*.
- (D) maníaca.

**Resposta Correta: C**

**QUESTÃO ANULADA** - Marque a alternativa que indica o transtorno de personalidade onde prevalece egocentrismo, a baixa tolerância a frustrações, a teatralidade e a superficialidade e impera a necessidade de fazer com que todos dirijam a atenção para eles próprios.

- (A) Transtorno de personalidade obsessiva.
- (B) Transtorno de personalidade narcisista.
- (C) Transtorno de personalidade dependente.
- (D) Transtorno de personalidade emocionalmente Instável.

**Justificativa:** Não há entre as alternativas a resposta correta.

Devido à anulação de 1 questão, as notas dos candidatos foram modificadas, independente de terem ou não recorrido. Nova pontuação disponível na publicação do Resultado Final dos Aprovados na 1ª etapa – Prova de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos e Avaliação Curricular.

- A respeito da avaliação psicológica durante o período pré-cirúrgico, é correto afirmar que:

(A) A avaliação psicológica tem como uma de suas finalidades identificar os fatores facilitadores que contribuirão para o êxito após o procedimento cirúrgico.

(B) No período pré-cirúrgico, a equipe de saúde não deve fornecer informações sobre os riscos, benefícios e limitações eventuais, posto que o foco é a saúde física do enfermo.

(C) A história pregressa de alcoolismo e adesão a drogas não necessariamente são consideradas na avaliação psicológica pré-cirúrgica, uma vez que não irão interferir no período pós-cirúrgico.

(D) Ainda sobre a atuação do psicólogo durante a avaliação psicológica pré-cirúrgica não cabe a este período a identificação de estratégias de enfrentamento por parte do enfermo.

**Resposta Correta: A**

- Pessoas com transtornos de personalidade borderline tendem a apresentar comportamentos de risco, dentre os quais, atentar contra a própria vida. Isso as leva, com certa frequência, às urgências e/ou emergências hospitalares, demandando atendimento específico, compatível com quadro de tentativa de autoextermínio. Ao lidar com este perfil de paciente, temos que lidar com risco iminente à vida. A respeito disso, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

(A) Esses pacientes possuem vidas tão insuportáveis emocionalmente, que a ideação suicida muitas vezes surge como um alívio.

(B) Nunca devemos expandir os nossos limites em crises, pois o paciente deve aprender a respeitar esses limites de outras pessoas para mudar o seu sofrimento intenso.

(C) Esses pacientes necessitam aprender reverenciar limites alheios, visando a redução do sofrimento intenso; por isso, sempre devemos ampliar possibilidades frente a crises.

(D) Devemos ter cuidado para, ao responder a uma crise de forma efetiva, muitas vezes dando para o paciente o que ele precisa, não reforçamos a probabilidade futura de mantê-lo em crises.



**Resposta Correta: B**

- Personalidade Histriônica apresenta os seguintes critérios gerais para diagnóstico:

(A) Expressão exagerada das emoções, teatralidade, sugestibilidade, afetividade superficial e lábil, busca constante por ser o centro das atenções, sedução inapropriada em comportamento ou aparência, busca de diversos parceiros simultâneos, desprezo por diagnósticos e críticas, preocupação excessiva com a aparência física, insinuações e exposições sexuais.

(B) Transtorno da ansiedade caracterizado por obsessões ou compulsões recorrentes e persistentes. Obsessões são ideias, pensamentos e imagens intrusivos, que são experimentados como não tendo sentido ou sendo repulsivos.

(C) Marcado distanciamento de relações sociais e preferência para realizar as demais atividades sozinhas, sentindo pouco ou nenhum prazer na realização dessas atividades. Assim, é comum que as pessoas com esse transtorno sejam descritas como distantes e indiferentes.

(D) Padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O tratamento é com psicoterapia e fármacos.

**Resposta Correta: A**

- Sobre a sexualidade humana, um psicólogo afirmou: “O sexo é uma condição orgânica, uma necessidade com o qual nascemos, mas o comportamento sexual não está lá desde o nascimento. Será constituído com base nas experiências individuais de cada um a partir dos seus diversos contextos sociais, culturais, econômicos etc. Somos o que, consciente e inconscientemente, filtramos e nos apropriamos”. Nessa perspectiva, tanto a orientação heterossexual como a homossexual são consideradas um:

(A) Comportamento instintivo aprendido a partir da interação com o ambiente.

(B) Comportamento aprendido e realizado segundo um padrão reflexo ou instintivo.

(C) Estado motivacional inato e hereditário cujo comportamento é instintivo.

(D) Comportamento aprendido a partir de condições orgânicas predeterminadas.

**Resposta Correta: D**



- Os transtornos de personalidade referem-se a conjuntos de traços profundamente arraigados, inflexíveis e inadaptados. Tipicamente, os traços são reconhecíveis próximos à adolescência e persistem por toda a vida.

(DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. Makron Books Ltda. São Paulo. p. 581.) -  
(Adaptado com nomenclatura atualizada)

Sobre "Transtornos de personalidade", analise as proposições com o código V, para verdadeiro ou F para falso:

( ) As pessoas com transtorno de personalidade de esquiva são muito insensíveis à possibilidade de rejeição ou humilhação, envolvendo-se facilmente em relacionamentos sociais.

( ) Indivíduos com transtorno de personalidade compulsiva são perfeccionistas, dedicados ao trabalho e à produtividade, mas são incapazes de sentir prazer ou expressão de afeto.

( ) As pessoas com transtorno de personalidade passivo-agressiva resistem a demandas de desempenho adequado no lar ou no trabalho, usando táticas como protelar, vadiar, ser ineficiente intencionalmente e esquecer-se.

( ) Os transtornos de personalidade fogem aos padrões persistentes e personalizados. Tendo como a principal e única causa a predisposição genética.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

(A) F, V, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, V, V.

(D) V, F, V, V.

**Resposta Correta: A**